

Крок М. Сестринська справа – 2017

1. У хворого напад стенокардії. Який найпростіший фізіотерапевтичний метод можна використати?

- A. * Гірчичники
- B. Зігріваючий компрес
- C. Міхур з льодом
- D. Банки
- E. Солюкс

2. На I етапі сестринського обстеження медсестра виявила чинники, які зумовили розвиток хронічного коліту у пацієнта. Який з них належить до ендогенних?

- A. * Перенесена дизентерія
- B. Нерегулярне харчування
- C. Гіподинамія
- D. Психоемоційний стрес
- E. Вживання великої кількості рідини

3. Лікар призначив пацієнту 53-х років, у якого спостерігаються набряки та закрепи, гіпертонічну клізму. Для її проведення медсестра використовує:

- A. * 10% розчин хлориду натрію
- B. Відвар ромашки
- C. 0,9% розчин хлориду натрію
- D. Холодну воду
- E. Соняшникову олію

4. Палатна медична сестра при догляді за пацієнтом 24-х років на третю добу після операції на травному каналі виявила здуття живота, гикавку, невідходження газів. Визначити найбільш імовірну потенційну проблему пацієнта:

- A. * Парез кишечника
- B. Заворот кишок
- C. Копростаз
- D. Кишкова непрохідність
- E. Перитоніт

5. При медсестринському обстеженні хворого на лусочковий лишай медична сестра використала методику, притаманну даній патології. Вкажіть методику, яку застосувала медична сестра:

- A. * Зішкрябування поверхні папул
- B. Змащування розчином йоду
- C. Накладання компресу
- D. Опромінювання люмінесцентною лампою
- E. Накладання примочки

6. До сімейної медичної сестри звернувся пацієнт 70-ти років з неоперабельною формою раку легень, який запитав чи можна йому провести евтаназію, оскількизнає, що він безнадійно хворий. Медична сестра відповіла, що в Україні евтаназія:

- A. * Заборонена
- B. Дозволена
- C. Кожен медичний працівник вирішує питання самостійно
- D. Дозволена для безнадійно хворих
- E. Дозволена у разі згоди родичів

7. В міську лікарнюпоступила жінка 45-ти років з приводу гіпертонічної хвороби. Медична сестра збирає медсестринський анамнез і проводить об'єктивне обстеження пацієнта. Який це етап медсестринського процесу?

- A. * I етап
- B. II етап
- C. III етап
- D. IV етап
- E. V етап

8. Під час переливання крові на кожні 500 мл крові донора медсестра вводила по 10 мл 10% розчину хлористого кальцію. Яка потенційна проблема попереджалася?

- A. * Цитратний шок
- B. Алергічна реакція
- C. Геморагічний шок
- D. Гемотрансфузійний шок
- E. Інфікування крові

9. Жінка 35-ти років, яка проживає у гірському районі, звернулась до сімейного лікаря зі скаргами на потовщення і тиск в ділянці шиї, утруднене ковтання, захриплість голосу, загальну слабкість. Яке захворювання можна запідозрити?

- A. * Ендемічний зоб
- B. Дифузний токсичний зоб
- C. Рак щитоподібної залози
- D. Гіпотиреоз
- E. –

10. Пацієнт 46-ти років скаржиться на біль у колінних, ліктьових суглобах "летючого характеру", який посилюється при рухах, температуру - 37,5оС ввечері. В анамнезі - часті ангіни. При огляді суглобів спостерігаються припухлість, почервоніння. Для якого захворювання характерні дані проблеми?

- A. * Ревматичний артрит
- B. Туберкульозний артрит
- C. Ревматоїдний артрит
- D. Гонорейний артрит
- E. Деформуючий остеоартроз

11. Пацієнтка 23-х років, за рекомендацією лікаря вимірювала базальну температуру протягом трьох менструальних циклів. Огляд результатів виявив двофазну криву. Про що це свідчить?

- A. * Нормальний менструальний цикл
- B. Ановуляторний цикл
- C. Персистенція фолікула
- D. Маткова вагітність
- E. Атрезія фолікула

12. До приймального відділення машиною швидкої допомоги доставлено пацієнта з шлунково-кишковою кровотечею. Три години тому було блювання у вигляді "кавової гущі". Суб'єктивно: відчуває себе задовільно, може рухатись самостійно. Як транспортувати пацієнта до відділення стаціонару?

- A. * На каталці, лежачи
- B. Самостійно у супроводі медичної сестри
- C. Самостійно без супроводу
- D. На кріслі-каталці
- E. На ношах двома санітарами

13. Пацієнту 45-ти років кількаразово вводили внутрішньовенно 10 мл 2,4% розчину еуфіліну. Після ін'єкції у хворого виникла гіперемія, набряк в місці ін'єкції, відчуття болю при пальпації по ходу вени. Яке ускладнення розвинулося у пацієнта?

- A. * Флебїт
- B. Повітряна емболія
- C. Медикаментозна емболія
- D. Пірогенна реакція
- E. Інфільтрат

14. У хлопчика 6-ти років з природженою вадюю серця (тетрада Фалло) розвинувся задухо-ціанотичний напад. Яке положення слід надати дитині для покращення її стану?

- A. * Колінно-грудне (навпочіпки)
- B. Лежачи, з підвищеним головним кінцем
- C. Напівсидячи
- D. Сидячи
- E. Горизонтальне

15. Дитина 10-ти років знаходиться на стаціонарному лікуванні з діагнозом "Кір". На фоні проведеного догляду і терапії на 8 день від початку захворювання, на обличчі з'явилась світло-коричнева пігментація з незначним свербінням. Стан дитини задовільний, $t_{\text{о}} - 36,5^{\circ}\text{C}$, дихання везикулярне, ЧД- 20/хв. Чи є пігментація проявом неадекватного догляду за дитиною?

- A. * Ні, пігментація - це прояв типового перебігу кору (II період)
- B. Так, пігментація є ускладненням кору
- C. Так, пігментація - це алергічна реакція на ліки

- D. Так, пігментація є проявом порушення гігієнічного режиму
- E. Ні, пігментація - це прояв ексудативно-катарального діатезу

16. У неврологічному відділенні при обстеженні пацієнта 55-ти років медична сестра оцінювала властивості пульсу і виявила, що він є нерегулярним (неритмічним). Як оцінити такі зміни пульсу?

- A. * Аритмія
- B. Брадикардія
- C. Гіпертензія
- D. Гіпотензія
- E. Тахікардія

17. Хвора 25-ти років скаржиться на нудоту, відрижку повітрям, відчуття тяжкості в епігастрії, проноси. Під час огляду: язик обкладений білим нальотом, живіт болючий в епігастральній ділянці. Яке дослідження є найбільш інформативним?

- A. * рН-метрія
- B. Дуоденальне зондування
- C. Копрологічне дослідження
- D. Загальний аналіз крові
- E. Загальний аналіз сечі

18. У хворої, яка страждає на гіпертиреоз, після психоемоційної травми з'явилися різке збудження, профузна пітливість, висока температура тіла (41°C), тахікардія, АТ- 160/70 мм рт.ст. Яке ускладнення розвинулось у пацієнтки?

- A. * Тиреотоксична криза
- B. Гіпертонічна криза
- C. Порушення мозкового кровообігу
- D. Напад серцевої астми
- E. Напад стенокардії

19. До медичної сестри звернувся пацієнт з забоем м'яких тканин. Який препарат з групи місцевих анестетиків необхідно використати для знеболення шляхом охолодження ділянки цієї травми?

- A. * Хлоретил
- B. Дикаїн
- C. Ефір
- D. Лідокаїн
- E. Новокаїн

20. У пацієнтки з цукровим діабетом після введення інсуліну з'явилися різка загальна слабкість, виражена пітливість, відчуття голоду, тремтіння, запаморочення. Об'єктивно: пацієнтка збуджена, шкіра волога, тургор збережений. Дихання не змінене. t_0 - 36,5°C, P_s - 96/хв., АТ- 110/70мм рт.ст. Що повинна зробити медсестра першу чергу?

- A. * Дати пацієнтці з'їсти грудочку цукру
- B. Ввести внутрішньом'язово розчин кофеїну

- C. Надати горизонтального положення з припіднятими ногами
- D. Ввести спазмолітичні препарати
- E. Застосувати гарячу ванну

21. До лікаря звернувся хворий з різаною раною передньої поверхні передпліччя, з якої витікає темно-червона кров. Що повинна виконати медична сестра за призначенням лікаря для тимчасової зупинки кровотечі?

- A. * Накладання стискаючої пов'язки
- B. Згинання кінцівки в суглобі
- C. Накладання артеріального джгута
- D. Накладання затискача
- E. Електрокоагуляція

22. У пацієнта на гіпертонічну хворобу після стресу ввечері з'явилась різка слабкість, біль в ділянці серця з іррадіацією в ліве плече і руку впродовж 30 хвилин, не знімається нітроглицерином. Об'єктивно: блідий, АТ- 90/60 мм рт.ст., Рс- 90/хв., аритмічний. Що запідозрить медична сестра?

- A. * Інфаркт міокарду
- B. Шок
- C. Колапс
- D. Серцева астма
- E. Стенокардія

23. При проведенні ранкового туалету в лікарняній палаті медична сестра проводила підмивання 2-х річної дівчинки в напрямку від лона до анального отвору. Якою анастомічною особливістю сечовивідних шляхів можна пояснити дії медсестри?

- A. * Сечовий канал короткий та широкий
- B. Слизова оболонка сечового міхура ніжна і пухка
- C. Стінка сечоводів атонічна
- D. М'язові волокна сфінктерів сечоводів недорозвинені
- E. Еластичні волокна мисок недорозвинені

24. У хворого гостра масивна крововтрата. Об'єктивно: свідомість збережена, хворий блідий, шкіра вкрита потом, пульс ниткоподібний, АТ- 100/60 мм рт.ст., дихання поверхневе, з частотою 24/хв. Вкажіть ускладнення, яке виникло внаслідок кровотечі:

- A. * Колапс
- B. Непритомність
- C. Гемотрансфузійний шок
- D. Кардіогенний шок III ст
- E. Анафілактичний шок

25. Пацієнтка 20-ти років звернулася в жіночу консультацію зі скаргами на застримування менструації протягом 2-х місяців, зміни апетиту, нудоту. Лікарем встановлена вагітність 7-8 тижнів. Назвати документ, який оформляється при взятті на

облік по вагітності:

- A. * Індивідуальна карта вагітної і породіллі
- B. Обмінна карта
- C. Амбулаторна карта
- D. Історія пологів
- E. Контрольна карта диспансерного спостереження

26. Пацієнт 53-х років поступив в кардіологічне відділення зі скаргами на інтенсивний пекучий біль за грудниною, який іррадіює в ліве плече і руку, триває 6-8 годин. Який метод діагностики застосовують для підтвердження діагнозу?

- A. * Електрокардіографія
- B. Фонокардіографія
- C. Електроенцефалографія
- D. Ехокардіографія
- E. Сфігмографія

27. Ви проводите догляд за хворим, якому проводиться лікувальна іммобілізація нижньої кінцівки циркулярною гіпсовою пов'язкою. Вранці хворий висловлює скарги на сильні болі у носі. Під часгляду: пальці загіпсованої кінцівки синюшні, набряклі, їх чутливість знижена. Якими мають бути дії медсестри?

- A. * Розрізати гіпсову пов'язку
- B. Зняти гіпсову пов'язку
- C. Обробити шкіру пальців йодонатом
- D. Накласти пов'язку на пальці
- E. Дати знеболююче

28. Хворий 29-ти років перебуває на диспансерному обліку з приводу ревматичної хвороби. Призначено профілактичне лікування. Який з перерахованих препаратів приготує медсестра?

- A. * Біцилін-5
- B. Папаверин
- C. Преднізолон
- D. Дигоксин
- E. Димедрол

29. Хворий 59-ти років перебуває на диспансерному обліку з приводу ревматоїдного артриту. Які проблеми виявить медсестра під час обстеження?

- A. * Скутість вранці
- B. Нудота
- C. Гіпертензія
- D. Біль у серці
- E. Втрата апетиту

30. Першороділля 20-ти років на третій день після термінових пологів скаржитися на підвищення температури до

39. Ос, озноб, біль внизу живота, гнійно кров'яністі виділення зі статевих органів. Яке ускладнення виникло у породіллі?

- A. * Післяпологовий ендометрит
- B. Лохіометра
- C. Аднексит
- D. Перитоніт
- E. Післяпологова виразка

31. У пологовий будинок поступила роділля. Пологи II, термінові. Розміри тазу 23-26-28-17 см. Пологова діяльність почалась 8 годин тому. Роділля неспокійна. Перейми часті, болючі. Матка у вигляді "піщаного годинника". Ознака Вастена позитивна. Яке ускладнення виникло у роділлі?

- A. * Загроза розриву матки
- B. Розрив матки, що розпочався
- C. Розрив матки, що відбувається
- D. Тетанус матки
- E. Звуження тазу III ступеня

32. Медична сестра гінекологічного відділення прийшла проводити вечірній туалет зовнішніх статевих органів хворій на рак шийки матки 70-ти років. Жінка поскаржилась на кровотечу зі статевих органів, яка щойно почалась. Хвора схвильована. Черговий лікар на операції. Що повинна зробити медична сестра до приходу лікаря?

- A. * Зробити тугу тампонаду піхви, заспокоїти хвору, сповістити лікаря
- B. Ввести кровоспинні засоби, сповістити лікаря
- C. Заспокоїти жінку, сповістити лікаря
- D. Призначити постільний режим, заспокоїти хвору
- E. Викликати лікаря

33. Дитина 2-х років хворіє на гострий стенозуючий ларинготрахеїт. Визначена IV ступінь захворювання. Який метод невідкладної допомоги доцільний в цьому випадку?

- A. * Трахеотомія
- B. Подання зволоженого кисню
- C. Відволікальна терапія
- D. Антигістамінні засоби
- E. Парові інгаляції

34. При проведенні проби на сумісність на пластинці змішали краплю крові донора та краплю сироватки хворого у співвідношенні 1:10, через 5 хвилин на пластинці з'явилася аглютинація. Про що свідчить наявність аглютинації?

- A. * Кров не сумісна за групою
- B. Кров сумісна
- C. Виникла холодова аглютинація
- D. Кров несумісна за резус-фактором
- E. Виникла хибна аглютинація

35. На першому етапі диспансеризації проводиться групування диспансерного контингенту. До якої диспансерної групи належать хворі з хронічними захворюваннями в стадії компенсації?

- A. * III
- B. I
- C. II
- D. IV
- E. V

36. Пацієнтка скаржиться на поширену висипку на шкірі, яка супроводжується нестерпним свербіжем. Висипка з'явилась на другий день після щеплення протигрипозною вакциною. Об'єктивно: стан задовільний. На шкірі обличчя, тулуба, верхніх та нижніх кінцівок – поширене уртикарне висипання, місцями зливного характеру, сліди від розчухів. Міхури рожево-червоного кольору, під вищуються над рівнем шкіри. Для якого захворювання характерні дані проблеми?

- A. * Гостра кропив'янка
- B. Вітряна віспа
- C. Системний червоний вовчак
- D. Набряк Квінке
- E. Скарлатина

37. У пацієнта 28-ми років неприємні відчуття в надчеревній ділянці, блювання, яке приносить тимчасове полегшення. Він пов'язує свій стан із споживанням недоброякісної їжі. Яке залежне медсестринське втручання необхідно здійснити медичній сестрі в першу чергу?

- A. * Промити шлунок
- B. Дати антациди
- C. Направити на УЗД
- D. Покласти міхур з льодом на епігастрій
- E. Дати проносні

38. Медична сестра повинна відключити систему після введення інфузійних розчинів пацієнту. Для цього необхідно в першу чергу:

- A. * Перекрити тік рідини затискачем
- B. Видалити голку з вени
- C. Видалити верхню голку системи з флакона
- D. Видалити голку - повітровід з флакона
- E. Прикласти стерильний ватний тампон до місця пункції

39. Медична сестра встановила наявні та потенційні проблеми у пацієнта, що перебуває на стаціонарному лікуванні в кардіологічному відділенні з приводу інфаркту міокарда. Який етап медсестринського процесу вона здійснила?

- A. * II
- B. IV
- C. V
- D. I
- E. III

40. Під час проведення передстериліза ційної обробки інструментів медична сестра ЦСВ приготувала реактив бензидину та нанесла 3 краплі на підготовлені інструменти. Що визначає медична сестра за допомогою даної проби?

- A. * Залишки крові
- B. Залишки миючого засобу
- C. Залишки ліків
- D. Залишки дезінфікуючого розчину
- E. Залишки олії

41. Під час підмивання пацієнтки з на дмірною вагою , медична сестра виявила гіперемію ділянки пахових складок. Подальша тактика медичної сестри під час догляду за пацієнткою передбачає:

- A. * Застосування присипки
- B. Застосування пластира
- C. Застосування пасти
- D. Застосування бовтанки
- E. Обробка 70% етилового спирту

42. До травм пункту звернувся пацієнт 25-ти років, який отримав травму правої гомілки. Які абсолютні клінічні ознаки при об'єктивному обстеженні будуть вказувати на перелом гомілки?

- A. * Крепітація кісткових відламків
- B. Біль в ділянці травми
- C. Наявність гематоми
- D. набряк м'яких тканин в ділянці травми
- E. Порушення функції кінцівки

43. До медичної сестри хірургічного кабінету звернулася сусідка зі скаргами на локальний біль в ділянці шлунка. З часом біль став інтенсивним. Медична сестра, при проведенні сестринського обстеження хворої, виявила додаткові скарги на нудоту, зниження апетиту та схуднення. Що порекомендує медична сестра пацієнтці?

- A. * негайно звернутися до онколога або хірурга
- B. Вживати знеболюючі засоби
- C. Вживати таблетки церукалу
- D. Дотримуватися дієти
- E. Пройти ультразвукове обстеження Шлунка

44. Вагітна пацієнтка 22-х років, мешканка Прикарпаття, звернулася у поліклініку з метою перевірки стану здоров'я. Скарги немає. Старша сестра пацієнтки була

прооперована з приводу вузлового зобу. Під час об'єктивного обстеження відхилень від норми не виявлено. Які поради слід надати пацієнтці?

- A. * Вживати препарати йоду і йодовмісні продукти
- B. Вживати препарати заліза, гранати, яблука
- C. Вживати ферменти, обмежити молоко
- D. Вживати мінеральну воду і лимони
- E. Вживати відвари шипшини і ромашки

45. У пацієнта 67-ми років, хронічна серцева недостатність. Яке положення треба надати пацієнту для полегшення задишки?

- A. *Напівсидячи з опущеними ногами
- B. Лежаче на животі
- C. Лежаче на лівому боці
- D. Лежаче на правому боці
- E. Лежаче на спині

46. У пацієнта виражена задишка. При обстеженні діагностували наявність рідини в плевральній порожнині. До якого втручання повинна підготувати пацієнта медична сестра?

- A. *Плевральна пункція
- B. Абдомінальна пункція
- C. Стернальна пункція
- D. Бронхоскопія
- E. Бронхографія

47. У дитини віком 6-ти років при огляді шкіри медична сестра виявила папули та однокамерні везикули по всьому тілі, включаючи волосисту частину голови. Вкажіть який медичний препарат для обробки елементів висипки з метою попередження їх інфікування повинна застосувати медична сестра:

- A. *1% спиртовий розчин діамантового зеленого
- B. 30% розчин сульфацилу натрію
- C. 1% розчин димедролу
- D. 50% розчин анальгіну
- E. 5% розчин йоду

48. В інфекційному відділенні на лікуванні перебуває дитина першого року життя, хвора на кашлюк. Яку проблему, як основну, виділить медсестра?

- A. *Спазматичний нападopodobний кашель
- B. Нежить
- C. блювання
- D. Гарячка
- E. Самовільне сечовипускання

49. Дитина 6-ти років захворіла на грип. Яка скарга при медсестринському обстеженні буде першочерговою?

- A. * Підвищення температури тіла до 39оС
- B. Вологий кашель
- C. Серозно-гнійні виділення з носа
- D. Шум у вухах
- E. Біль у животі

50. Ви оглядаєте потерпілого з вогне пальноюраною правого стегна. Локально: в рані видно осколки стегнової кістки, рана кровоточить пульсуючим струменем. Ваші першочергові дії:

- A. * Накласти джгут
- B. Накласти асептичну пов'язку
- C. Ввести знеболюючі
- D. Транспортувати потерпілого в найближчу лікарню
- E. Провести транспортну іммобілізацію подручними засобами

51. У 5-річної дитини через 3-5 хвилин після укусу бджоли посилюється різкий біль в місці укусу, погіршився загальний стан, відчуття жару та недостатку повітря, головокружіння, шум у вухах. Виразена блідість шкіри акроціаноз, холодний липкий піт на тілі, різко знижений АТ. Який стан розвинувся у дитини?

- A. * Анафілактичний шок
- B. Гіперглікемічна кома
- C. набряк Квінке
- D. Гіпоглікемічна кома
- E. Ацетонічний синдром

52. Дитині віком 1 місяць з метою профілактики рахіту призначають:

- A. * Аквадетрім
- B. Аскорутін
- C. Фестал
- D. Пантенол
- E. Фарінгосепт

53. Потерпілий скаржить на болі внизу живота і неможливість рухати ногами. При пальпації визначається болючість в проекції лобкового зрощення, осьове навантаження посилює біль. Визначається позитивний симптом прилиплої п'яти. Як необхідно виконати транспортну іммобілізацію?

- A. * Лежачи на спині в положенні "жаби"
- B. Лежачи на животі
- C. Лежачи на спині
- D. Стоячи
- E. Напівсидячи

54. У хворої 48-ми років скарги на болі у ділянці лівої сідниці, підвищена t_{0} до $38,5^{\circ}\text{C}$. Протягом 10-ти днів проводились в/м ін'єкції. Об'єктивно: загальний стан задовільний, у ділянці лівої сідниці визначається утворення розміром 5×5 см, шкіра над ним гіперемійована, болюча на дотик, в центрі визначається розм'якшення. Який найбільш імовірний діагноз?

- A. *Післяін'єкційний абсцес
- B. Фурункул
- C. Карбункул
- D. Флегмона
- E. Ліпома

55. Чоловік звернувся до лікувального закладу зі скаргами на болючу припухлість верхньої повіки лівого ока. Об'єктивно: на обмеженій ділянці краю верхньої повіки, припухлість, яка має жовтуватий колір, на верхівці пустула, по периферії гіперемія, набряк. Який найбільш імовірний діагноз?

- A. *Ячмінь
- B. Халязіон
- C. Абсцес
- D. Флегмона
- E. Алергічний набряк

56. Хворому із пароніхією лівого вказівного пальця призначене оперативне лікування під анестезієюза методом Оберста-Лукашевича. Який анестетик та в якій кількості повинна підготувати медсестра?

- A. *1% розчин новокаїну 20 мл
- B. 0,25% розчин новокаїну 200 мл
- C. 5% розчин новокаїну 2 мл
- D. 2% розчин дикаїну 3 мл
- E. 0,5% розчин лідокаїну 500 мл

57. У дитини 3-х років на другий день хвороби загальний стан погіршився. Дитина стала неспокійною, дихання шумне, допо міжні м'язи грудної клітки беруть участь у акті дихання. "Гавкаючий" кашель, голос сиплий. Яке незалежне втручання слід провести для надання допомоги?

- A. *Зробити лужну інгаляцію
- B. Надати горизонтальне положення
- C. Накласти зігріваючий компрес на грудну клітку
- D. Зрошувати ротову порожнину розчином фурациліну
- E. Закрапати ніс розчином "Називін"

58. Медична сестра готує набір інструментів. Вкажіть за допомогою якого інструмента проводять інструментальну ревізію порожнини матки:

- A. *Кюретка

- В. Конхотом
- С. Скальпель
- Д. Абортцанг
- Е. Ложечка Фолькмана

59. Дитина від доношеної вагітності на родилась з оцінкою за шкалою Апгар 2 бали. Що потрібно негайно провести в пологовому залі, враховуючи стан дитини?

- А. * Реанімаційні заходи
- В. Зважування дитини
- С. Щеплення проти гепатиту В
- Д. Обстеження на фенілкетонурию
- Е. Купання дитини

60. Студент, що вперше переступив поріг операційної, раптом відчув слабкість, запаморочення, "дзвін" у вухах. Знепритомнів. Об'єктивно: шкірні покриви бліді, вкриті холодним липким потом. Пульс - 60/хв., АТ- 90/60 мм рт.ст. Зіниці розширені, жваво реагують на світло. Назвіть стан, який розвинувся:

- А. * Непритомність
- В. Колапс
- С. Кардіогенний шок
- Д. Анафілактичний шок
- Е. Клінічна смерть

61. В школі виник спалах захворювання на вірусний гепатит А. На який шлях передачі інфекція повинна звернути увагу медична сестра школи?

- А. * Фекально-оральний
- В. Повітряно-краплинний
- С. Трансмісивний
- Д. Парентеральний
- Е. –

62. Пацієнтка 58-ти років, поступила у ендокринологічне відділення у тяжкому стані. При медсестринському обстеженні виявлено: свідомість відсутня, шкіра суха, очі запалі, ціаноз, запах ацетону з рота. Який медикамент найбільш доцільно підготувати медсестрі для надання невідкладної допомоги?

- А. * Інсулін короткої дії
- В. Інсулін пролонгованої дії
- С. 40% р-н глюкози
- Д. Фізіологічний розчин
- Е. –

63. Пацієнтка при відвідуванні її вдома сімейною медсестрою, повідомила, що після переохолодження у неї з'явилися головний біль, озноб, температура підвищилась до $t_{0} = 37,8^{\circ}\text{C}$. Які незалежні мед сестринські втручання необхідно виконати сімейній медсестрі?

- A. *Тепло вкрити і дати гарячі напої
- B. Рекомендувати висококалорійну їжу
- C. Дати жарознижувальні препарати
- D. Накласти гірчичники на грудну клітку
- E. Дати міцний чай або каву

64. Швидка допомога приїхала на місце ДТП. Чоловік 30-ти років скаржиться на біль, відсутність рухів в правій нозі. При огляді: у середній третині гомілки набряк, деформація, патологічна рухомість. Що застосувати для транспортної іммобілізації?

- A. *Шини Крамера
- B. Шину Дітерікса
- C. Шину Ентіна
- D. Шину Белера
- E. Еластичний бинт

65. У хірургічному відділенні пацієнту 50-ти років з виразковою хворобою шлунку, ускладненою кровотечею, проведено гемотрансфузію. Яке лабораторне обстеження необхідно планувати на наступний день?

- A. *Клінічний аналіз крові і сечі
- B. Аналіз крові на цукор
- C. Пробу за Зимницьким
- D. Коагулограму
- E. Аналіз крові на RW

66. При обстеженні пацієнта сестрою єдиною були виявлені наступні симптоми: поліурія, спрага, полідипсія, поліфагія, свербіж шкіри. Про яке захворювання слід думати?

- A. *Цукровий діабет
- B. Ниркову недостатність
- C. Гіпотиреоз
- D. Дифузний токсичний зоб
- E. Тиреоїдит

67. При ушкодженні порожнистих органів черевної порожнини відсутня печінкова тупість, а при рентгенологічному дослідженні визначається ознака

- A. *Повітря під куполом діафрагми
- B. Чашки Клойбера
- C. Роздуті петлі кишечника
- D. Горизонтальні рівні рідини
- E. Гаустрація кишечника

68. Медична сестра з лікарем визначають групу крові хворому за допомогою цоліклонів анти-А і анти-В. Оцінювання результатів: реакція аглютинації відбулася з цоліклоном анти-А, а з цоліклономанти-В не відбулася. Яка у хворого група крові?

- A. *А (II)

- B. 0 (I)
- C. AB (IV)
- D. B (III)
- E. Помилка при визначенні

69. Жінка 30-ти років, яка хворіє бронхіальною астмою, дізналась про можливість самоконтролю прохідності бронхів за допомогою приладу індивідуального користування, який можна використовувати в домашніх умовах, але не знає як ним користуватися. Якому методу діагностики навчить жінку медична сестра?

- A. *Пікфлоуметрії
- B. Пневмотахометрії
- C. Спірометрії
- D. рН-метрії
- E. Визначення ЖЄЛ

70. Пацієнту 33-х років, який знаходиться на стаціонарному лікуванні з діагнозом "гострий бронхіт", медсестра для покращення дихальної функції кровообігу запланувала постановку гірчичників на задню поверхню грудної клітки. Які речовини можуть спричинювати подразнюючу дію гірчичників?

- A. *Ефірні олії
- B. Терпенові сполуки
- C. Органічні сполуки
- D. Фенольні сполуки
- E. Спирти

71. У роділлі 25-ти років при піхвовому обстеженні шийка матки згладжена, розкриття 4 см, плодовий міхур відсутній, передлегла частина сідниці. Вкажіть період пологів:

- A. *I період пологів
- B. II період пологів
- C. Провісники пологів
- D. III період пологів
- E. Післяпологовий період

72. Хворому 70-ти років в стані гіпоксії призначено оксигенотерапію. Що планує медсестра здійснити перед подачею кисню?

- A. *Зволоження кисню
- B. Зрошення порожнини рота
- C. Підрахунок частоти дихальних рухів
- D. Виміряти артеріальний тиск
- E. Змащування слизової оболонки носових ходів

73. В хірургічному відділенні хворого 45-ти років після операції з приводу звуження стравоходу годують через фістулу -гастростому. Для запобігання подразненню навколо гастростоми медсестра шкіру обробляє:

- A. * Пастою Лассара

- В. 5% розчином перманганату калію
- С. Клеолом
- Д. МаззюВ ишневського
- Е. 10% розчином камфорного спирту

74. Хворий скаржиться на наростаючу м'язову слабкість, підвищену втомлюваність, зниження працездатності, безсоння, періодичний біль в животі, нудоту. Об'єктивно: шкірні покриви бронзового відтінку, відмічається пігментація слизової оболонки порожнини рота. Пульс – 80 уд/хв., ритмічний, слабкого наповнення і напруження. АТ-90/60 мм рт.ст. Тони серця ослаблені, діяльність ритмічна. Прояке захворювання можна подумати?

- А. *Хвороба Аддісона
- В. Феохромоцитома
- С. Первинний альдостеронізм
- Д. Нецукровий діабет
- Е. Акромегалія

75. Дитині 1 місяць. На 2-му тижні життя з'явилося блювання. Останній тиждень блювання виникає після кожного годування у вигляді "фонтану". Об'єм блювотних мас перевищує об'єм висмоктаного молока. Дефіцит маси тіла - 8%. Про яке захворювання можна подумати?

- А. *Пілоростеноз
- В. Пілороспазм
- С. Гіпотрофія
- Д. Проста диспепсія
- Е. Кишковий токсикоз

76. Дитині 5-ть місяців. Була в контактi з хворим на кашлюк. Хворіє 2 тижні, за останній тиждень стан дитини погіршився. Напади кашлюзросли до 15 разів на добу, супроводжуються репризами, часто закінчуються блюванням. Назвіть потенційну проблему:

- А. * Апноє
- В. Сухий кашель
- С. Блювання
- Д. Анорексія
- Е. Репризи

77. Вихователь дитячого садочка звернулась до медичної сестри із хлопчиком 3-х років. Скарги: підвищення температури до 37,5о С та висипання на шкірі. Попередньо виставлений діагноз: вітряна віспа. Визначте тривалість карантину в дитячому садочку з контактними дітьми:

- А. *21 день
- В. 7 днів
- С. 10 днів
- Д. 14 днів

Е. 30 днів

78. Пацієнт 54-х років, скаржиться на тяжкість та біль в потилиці, ”миготіння мушок перед очима”, шум у вухах, кровотечі з носа. Вночі у пацієнта виник різкий біль голови, нудота, блювання, біль в ділянці серця. Яке ускладнення у пацієнта?

- А. *Гіпертонічна криза
- В. Напад стенокардії
- С. Гіпотонічна криза
- Д. Ішемічний інсульт
- Е. Геморагічний інсульт

79. У пацієнта 56-ти років спостерігається задишка, яка супроводжується затрудненим видихом, зумовлена спазмом дрібних бронхів і скупченням в їхньому просвіті в'язкого секрету. Як називається така задишка?

- А. *Експіраторна
- В. Апноє
- С. Змішана
- Д. Інспіраторна
- Е. Тахіпноє

80. Який з перелічених методів обстеження є найважливішим в діагностиці раку шлунка?

- А. *Гастродуоденоскопія з цитологічним дослідженням матеріалу
- В. Дослідження калу на приховану кров
- С. Дослідження шлункової секреції з гістаміном
- Д. Дослідження шлункової секреції за допомогою ”Ацидотеста”
- Е. Рентгенологічне дослідження

81. Для трахеостомії використовують спеціальний інструмент:

- А. *Трахеостомічна трубка Люєра
- В. Распатор Дуайєна
- С. Гачки Фарабефа
- Д. Пилка Джиглі
- Е. Розширювач Мікуліча

82. У роділлі через 20 хвилин після народження дитини з'явилися інтенсивні кров'яністі виділення зі статевих шляхів. Ознак відокремлення плаценти немає. Що слід зробити в першу чергу в даному випадку?

- А. *Ручне відділення та видалення плаценти
- В. Підготувати жінку до негайної лапаротомії
- С. Підготувати до екстирпації матки без додатків
- Д. Підготувати до екстирпації матки з додатками

Е. Підготувати до ампутації матки

83. Хворий скаржиться на висипання на верхній губі та незначне печіння, які з'являються після переохолодження. Об'єктивно: на червоній облямівці верхньої губи на еритематозному фоні мають місце дрібні міхурці з прозорим вмістом, які зливаються між собою. Про яке захворювання слід подумати?

- А. *Простий герпес
- В. Контактний дерматит
- С. Вульгарна міхурчатка
- Д. Імпетиго
- Е. Екзема

84. Виберіть інструмент, який відноситься до загального інструментарію:

- А. *Затискач Більрота
- В. Щипці Лістона
- С. Щипці Люєра
- Д. Ложечка Фолькмана
- Е. Щипці Фарабефа

85. Патронажній медсестрі необхідно навчити матір дитини 1-го року життя визначати зріст дитини. За якою формuloю визначається зріст дитини після 1-го року життя?

- А. $*75+(5 \times n)$
- В. $90+n - 1$
- С. $100+n - 5$
- Д. $80+(2 \times n)$
- Е. $76+(2 \times n)$

86. Мати дитини двох років поскаржилась, що у дитини приступи кашлю. При огляді дитини спостерігається спазматичний кашель з репрізами. Що можна запідозрити?

- А. *Кашлюк
- В. Крупозна пневмонія
- С. Бронхіальна астма
- Д. Вогнищева пневмонія
- Е. Ексудативний плеврит

87. Медична сестра проводить у школі бесіду з дівчатками-підлітками про функціонування репродуктивної системи у жінок. Що вона має відповісти на запитання однієї з дівчаток про тривалість нормального менструального циклу?

- А. *21-35 днів
- В. 18-20 днів
- С. 15-20 днів
- Д. 50 днів
- Е. 14 доби

88. Хворий 43-х років, працівник м'ясо комбінату, захворів раптово. Скаржиться на біль голови, високу температуру, різь в очах, біль у м'язах, особливо литкових, попереку, жовтушний колір шкіри обличчя, темну сечу. Об'єктивно: на губах - герпетичні висипання, збільшені печінка та селезінка, олігурія. Температура тіла - 37,8°C, АТ- 90/50 мм рт.ст. Дані ознаки характерні для:

- A. *Лептоспірозу
- B. Черевного тифу
- C. Вірусного гепатиту
- D. Висипного тифу
- E. Бруцельозу

89. Пацієнт 40-ка років лікується з приводу сухого плевриту. Турбують інтенсивні болі в правій половині грудної клітки. Яке положення в ліжку слід порадити пацієнту для зменшення болю?

- A. * На правому боці
- B. На лівому боці
- C. З припіднятим головним кінцем ліжка
- D. З припіднятими ногами
- E. На спині з припіднятим головним кінцем ліжка

90. У хворого на виразкову хворобу шлунка після фізичного напруження раптово з'явився "кинжалний" біль у верхніх відділах живота, напруження м'язів передньої черевної стінки, швидке погіршення загального стану, позитивний симптом Щоткіна-Блумберга. Яке ускладнення виразкової хвороби шлунка найбільш імовірно?

- A. *Перфорація
- B. Шлункова кровотеча
- C. Малігнізація
- D. Евентрація
- E. Пенетрація

91. Пацієнту з відкритим переломом стегна, ускладненим артеріальною кровотечею, наклали джгут, ввели знеболюючі препарати. Що буде наступним етапом у веденні пацієнта?

- A. *Накладання захисної асептичної пов'язки на рану
- B. Госпіталізація хворого у травматологічне відділення
- C. Холод на місце травми
- D. Імобілізація пошкодженої кінцівки
- E. Надання хворому зручного положення

92. У 2-х річної дитини на 2-й день захворювання ГРВІ раптово вночі розвинулася шумна інспіраторна задишка, виражене втягіння міжреберних проміжків, роздування крил носа і гавкаючий кашель. Який найбільш імовірний діагноз?

- A. *Гострий стенозуючий ларингіт
- B. Бронхіальна астма
- C. Обструктивний бронхіт

- D. Пневмонія
- E. Стороннє тіло у бронху

93. У 5-ти річної дитини під час їжі раптово виник кашель, стридорозне дихання, позиви на блювання, ціаноз. Про що слід думати у першу чергу?

- A. * Аспірація стороннього тіла
- B. Кашлюк
- C. Гострий ларингіт
- D. Гострий ларинготрахеїт
- E. Гостра пневмонія

94. У терапевтичному відділенні знаходиться пацієнт 45-ти років з хронічною недостатністю кровообігу. Визначивши кількість виділеної сечі за добу (добовий діурез) та порівнявши її із кількістю випитої рідини та введеної парентерально, медична сестра визначила, що пацієнт виділив більше сечі, ніж отримав рідини. Як називається цей діурез?

- A. *Позитивний
- B. Від'ємний
- C. Нормальний
- D. Негативний
- E. Незбалансований

95. В приймальне відділення доставлено пацієнта з вираженою задишкою, ціанозом, набряками на гомілках. У який спосіб медсестра повинна транспортувати його до відділення?

- A. *На кріслі-каталці
- B. Повільно пішки у супроводі медсестри
- C. На ношах
- D. На каталці
- E. Повільно пішки у супроводі двох санітарок

96. Утопленого чоловіка 48-ми років доставили на берег через 6 хвилин після утоплення. Непритомний, пульс не визначається. Почали серцево-легеневу реанімацію: ШВЛ методом "з рота в рот" і масаж серця. Яка з перерахованих ознак вказує на ефективність реанімаційних заходів?

- A. *Звуження зіниць
- B. Підвищення артеріального тиску
- C. Прискорення пульсу
- D. Сповільнення пульсу, часте дихання
- E. Прискорення дихання

97. При організації харчування в санаторії "Роша" дієтичною сестрою було встановлено, що відпочиваючі забезпечені 4-х разовим харчуванням. Яку частину добової енергетичної цінності повинен складати їх сніданок?

- A. *25%

- B. 30%
- C. 35%
- D. 40%
- E. 45%

98. Чергова медсестра визначила то у палаті недоношених новонароджених і вона дорівнює 21оС. Який показник то є опти- мальним?

- A. * 25оС
- B. 20оС
- C. 18оС
- D. 21оС
- E. 30оС

99. Пацієнта в ділянці лопаток, хребта, ліктів, п'яток поверхнєве (неглибоке) порушення цілісності шкіри з поширенням на підшкірну основу. Стійка гіперемія, відшарування епідермісу. Як характеризувати стан пацієнта?

- A. *Пролежні II ступеня
- B. Ризик розвитку пролежнів
- C. Пролежні I ступеня
- D. Пролежні III ступеня
- E. Пролежні IV ступеня

100. Вагітна 31-32 тижні вагітності, надійшла зі скаргами на появу безболісної кровотечі зі статевих шляхів. Об'єктивно: блідість шкіри та видимих слизових оболонок, матка в нормотонусі. АТ- 100/60 мм рт.ст., Рс- 86/хв. Кровотеча зі статевихшляхів. При УЗД - край плаценти перекриває внутрішнє вічко. Клінічна картина характерна для:

- A. * Передлежання плаценти
- B. Самовільний викидень
- C. Ризик передчасних пологів
- D. Відшарування плаценти
- E. Рак шийки матки

101. Медсестру викликали в палату до пацієнтки, у якої почалася кровотеча з варикозної виразки у ділянці нижньої третини лівої гомілки. Пацієнтка налякана, скаржитися на слабкість. Вкажіть незалежні втручання медичної сестри:

- A. *Накласти стискаючу пов'язку
- B. Накласти артеріальний джгут
- C. Накласти венозний джгут
- D. Викликати лікаря
- E. Виміряти пульс та артеріальний тиск

102. До жіночої консультації звернулася жінка зі скаргами на нагрубання молочних залоз, блювання вранці, затримку місячних на 2 місяці. Який метод обстеження необхідно застосувати для підтвердження вагітності?

- A. * Дворучне піхвове дослідження
- B. Чотири прийоми Леопольда
- C. Визначення ВСДМ
- D. Аналіз крові
- E. Зважування жінки

103. Дівчинка 14-ти років скаржиться на неспокій, плаксивість, пітливість, підвищений апетит, схуднення. Об'єктивно: температура тіла - 37,5оС, вологі долоні, тремтіння повік і язика, тахікардія, екзофтальм, блиск очей. Про яке захворювання йдеться?

- A. * Дифузний токсичний зоб
- B. Вегето-судинна дисфункція
- C. Гіпофізарний нанізм
- D. Цукровий діабет
- E. Гіпотиреоз

104. У пацієнта 40-ка років, що хворіє на виразкову хворобу шлунка, стан різко погіршився: з'явилися нудота, блювання "кавовоюг ущею", наростаюча слабкість. За призначенням лікаря медсестра введе:

- A. * Дицинон
- B. Димедрол
- C. Церукал
- D. Но-шпу
- E. Анальгін

105. У хворого перелом ключиці без зміщення відламків. Якою пов'язкою краще виконати іммобілізацію перед відправкою до травм пункту?

- A. * Пов'язка Дезо
- B. Хрестоподібна
- C. Черепашача
- D. Колосоподібна
- E. Спиральна

106. Медична сестра амбулаторії сімейної медицини проводить патронаж вагітної у терміні 32 тижні. Вагітна поскаржилась на головний біль, миготіння перед очима. Медична сестра визначила: артеріальний тиск - 180/110 мм рт.ст., набряки на нижніх кінцівках, передній черевній стінці, обличчі. Для якої патології характерна дана симптоматика?

- A. * Прееклампсія III ступеня
- B. Прееклампсія II ступеня
- C. Прееклампсія I ступеня
- D. Гіпертензія вагітних
- E. Водянка вагітних

107. Медична сестра пульмонологічного відділення здійснює медсестринський процес у хворого з гарячкою. III етап медсестринського процесу вона документує у:

- A. *План догляду за пацієнтом
- B. Історію хвороби
- C. Листок медсестринського обстеження пацієнта
- D. Листок оцінки якості догляду
- E. Карту спостереження за хворим

108. Пацієнтка 39-ти років скаржиться на гострий "кинжальний біль" в животі, який посилюється під час руху, сухість у роті, нудоту, слабкість. В анамнезі - виразкова хвороба шлунка. Об'єктивно: шкіра бліда, вкрита холодним потом, язик сухий обкладений. Живіт дошкоподібний, болючий в епігастральній ділянці. Симптом Щоткіна-Блюмберга позитивний. Яка проблема є пріоритетною даному випадку?

- A. *"Кинжальний біль"
- B. Нудота
- C. Загальна слабкість
- D. Сухість у роті
- E. Посилене потовиділення

109. В терапевтичному відділенні лікується пацієнт 39-ти років з хронічним колітом. Від яких чинників буде залежати стан пацієнта при проведенні медсестринського процесу?

- A. *Взаємодії медичної сестри і пацієнта
- B. Взаємодії медсестри і старшої медсестри
- C. Професіоналізм медичної сестри
- D. Взаємодії медсестри і родичів пацієнта
- E. Взаємодії медсестри і лікаря

110. У пацієнта після переохолодження підвищилась температура до 38°C, озноб, пітливість, біль у поперековій ділянці, часте та болюче сечовипускання. Для якого захворювання це характерно?

- A. * Гострий пієлонефрит
- B. Сечокам'яна хвороба
- C. Гострий гломерулонефрит
- D. Хронічний гломерулонефрит
- E. Хронічна хвороба нирок

111. Під час медичного огляду новонародженої дівчинки 6-ти днів життя медсестра виявила нагрубання грудних залоз. При якому стані зустрічається така проблема?

- A. *Статевий криз
- B. Мастит
- C. Фізіологічна еритема
- D. Фізіологічна лихоманка
- E. Фізіологічна жовтяниця

112. До приймального відділення швидка допомога привезла непритомного постраждалого. Об'єктивно: кровотеча з вух та носа, на потиличній ділянці голови - забійна рана 4x3 см. До якого відділення слід направити пацієнта?

- A. *Нейрохірургічне
- B. Неврологічне
- C. Хірургічне
- D. Терапевтичне
- E. Діагностичне

113. Мати звернулася до дільничної медсестри із скаргами на те, що в її дитини віком 5-ти років підвищилась температура тіла до 38оС, з'явився сухий кашель, переважно вночі, після кашлюблю вання. Щодня кашель частішає. Під час кашлюобличчя дитини набрякле, ціанотичне, набрякають шийні вени, очі наливаються кров'ю. Напади спостерігаються 10-15 разів на добу. На скільки днів ізолюють хворого при цьому захворюванні?

- A. *30 днів
- B. 7 днів
- C. 12 днів
- D. 10 днів
- E. 20 днів

114. При проведенні непрямого масажу серця і ШВЛ у новонародженого в пологовій залі співвідношення компресій грудної клітки до частотиШВЛ складає:

- A. *3:1
- B. 1:1
- C. 5:1
- D. 1:2
- E. 4:1

115. Пацієнтка 36-ти років звернулася до медичної сестри з приводу появи впродовж останніх декількох місяців швидкої втомлюваності, постійного серцебиття, дратівливості, пітливості, схуднення. Зі слів пацієнтки, вказані зміни з'явилися після стресу. Об'єктивно: стовщення шії в нижній третині, екзофтальм, тремор пальців рук. Про яке захворювання може подумати медсестра?

- A. *Тиреотоксикоз
- B. Гіпотиреоз
- C. Ендемічний зоб
- D. Акромегалія
- E. Хвороба Аддісона

116. Пацієнту 32-х років медсестра вводила за призначенням лікаря внутрішньовенно 10% р-н кальціюхлориду , пацієнт відмітив пекучий біль в місці ін'єкції. Яке ускладнення повинна запідозрити медсестра в місці ін'єкції?

- A. *Некроз тканини
- B. Гематома

- C. Флебїт
- D. Емболїя
- E. Тромбофлебїт

117. Пацієнтка 25-ти років скаржиться на біль, свербіння, печіння, серозно-гнійні виділення. Об'єктивно: набряк зовнішніх статевих органів, гіперемія слизової оболонки вульви. Як оцінити ці проблеми?

- A. * Вульвіт
- B. Аднексит
- C. Кольпіт
- D. Ендометрит
- E. Ерозія шийки матки

118. У дівчинки 5-місячного віку протягом останніх 2-х тижнів після переходу на змішане вигодовування з підгодовуванням коров'ячим молоком з'явилися часті розріджені випорожнення. Стан задовільний, інших скарг немає. Результати посіву випорожнень на патогенну мікрофлору негативні. Що порадите для нормалізації стану?

- A. * Замінити коров'яче молоко на адаптовану молочну суміш
- B. Призначити водно-чайну паузу на 72 години
- C. Зменшити кількість коров'ячого молока
- D. Перейти повністю на штучне вигодовування
- E. Призначити ферментні препарати

119. В приймальне відділення районної лікарні поступив хворий зі скаргами на тупий постійний біль оперізувального характеру, нудоту, блювання. Які залежні дії медичної сестри для уточнення діагнозу?

- A. * Взяти сечу на діастазу
- B. Взяти кал для копрограми
- C. Підготувати пацієнта до ректороманоскопії
- D. Підготувати пацієнта до колоноскопії
- E. Виконати дуоденальне зондування

120. В хірургічне відділення поступив пацієнт 56-ти років з масивною крововтратою. Стан важкий. Група крові ще невідома. Назвіть препарат, з якого слід почати поповнювати крововтрату:

- A. * Реополіглюкін
- B. Плазма
- C. Гемодез
- D. Неогемодез
- E. Сорбілакт

121. Ви працюєте медичною сестрою здоров'я пункту. До Вас звернулася пацієнтка 53-х років з скаргами на нудоту, блювання з домішками жовчі, гіркоту в роті. Під час обстеження: позитивні симптоми Грекова-Ортнера, Мерфі. Виявлені симптоми дозволяють запідозрити у пацієнта:

- A. * Гострий холецистит
- B. Гострий панкреатит
- C. Виразкова хвороба шлунка
- D. Кишкова механічна непрохідність
- E. Гострий апендицит

122. До медсестри звернулась пацієнтка 43-х років, з скаргами на неприємні відчуття в ділянці відхідника, свербіж, підвищену вологість. Під час дефекації при натужуванні відмічає появу "шишок" із прямої кишки. Дані скарги дозволяють запідозрити:

- A. * Геморой
- B. Тріщини прямої кишки
- C. Парапроктит
- D. Проктит
- E. Рак прямої кишки

123. При наданні невідкладної допомоги у разі травматичного шоку пацієнту не обхідно ввести наркотичний анальгетик. Який з препаратів не рекомендується для введення внаслідок пригнічення дихання?

- A. * Морфін
- B. Промедол
- C. Омнопон
- D. Кодеїн
- E. Фентаніл

124. У хірургічному відділенні лікується пацієнт з приводу виразкової хвороби 12-палої кишки. Ввечері він поскаржився на слабкість, нудоту. При огляді блідий, вкритий холодним потом. Пульс частий, слабкого наповнення і напруження, АТ-80/60 мм рт.ст. Вкажіть дії медичної сестри:

- A. * Покласти холод на живіт, викликати лікаря
- B. Ввести кофеїн, викликати лікаря
- C. Зробити промивання шлунка, викликати лікаря
- D. Покласти тепло на живіт, вкрити пацієнта
- E. Зробити очисну клізму, промивні води відправити на аналіз

125. До сімейної медичної сестри звернулась мати з дитиною в ком 1 місяць зі скаргами на постійні закисання правого ока з народження. При натисканні на область слізного мішка із нижньої слізної точки виділяється гній. Яке захворювання запідозрити медична сестра?

- A. * Дакріоцистит новонароджених
- B. Гострий дакріоденіт
- C. Гострий кон'юнктивіт
- D. Гострий іридоцикліт
- E. Гострий кератит

126. У хворого 32-х років, що перебував на протязі, виник біль за вухами, підвищилася температура тіла. Через 2 дні хворий не зміг закрити праве око, надути праву щоку, з'явилася асиметрія обличчя. Який попередній діагноз?

- A. *Невралгія трійчастого нерва
- B. Неврит лицевого нерва
- C. Потилична невралгія
- D. Інсульт
- E. Геморагічний інсульт

127. Прибувши на місце аварії, у потерпілого діагностували множинний перелом ребер. Потерпілому надана перша медична допомога та вирішено транспортувати його в лікувальний заклад. В якому положенні слід здійснювати транспортування пацієнта?

- A. *В напівсидячому
- B. Лежачи на спині
- C. Лежачи на животі
- D. На спині на щиті
- E. Лежачи на здоровому боці

128. Пацієнт о 13:00 отримав травму припадінні із мотоцикла. Турбували головний біль, нудота та блювання. О 18:00 втратив свідомість. При огляді хворий без свідомості. Ps- 54/хв. Виражені симптоми Керніга та ригідність потиличних м'язів. На основі яких даних медсестра зробить висновок про виникнення у пацієнта стиснення головного мозку?

- A. * Наявності "світлого проміжку"
- B. Втрати свідомості
- C. Нудоти та блювання
- D. Неефективності знеболювання
- E. Розладів гемодинаміки

129. Жінка 26-ти років доставлена до приймального відділення зі скаргами на раптовий біль в нижній частині живота, слабкість, втрату свідомості. Попередня менструація 2 тижні тому. Об'єктивно: Ps- 120/хв., АТ- 80/50 мм рт.ст., болісність та симптоми подразнення очеревини внизу з правого боку. У крові: Нв- 106 г/л. Дана клінічна картина характерна для:

- A. * Апоплексії яєчника
- B. Порушеної трубної вагітності
- C. Перекруту ніжки яєчника
- D. Гострого аднекситу
- E. Гострого апендициту

130. До гінекологічного відділення поступила пацієнтка зі скаргами на рясні кров'яністі виділення зі статевих шляхів, сильний переймоподібний біль внизу живота. Об'єктивно: АТ- 100/60 мм рт.ст., Ps-90/хв. При піхвовому дослідженні: зовні-шне вічко шийки матки пропускає палець. Матка збільшена до 8-9 тижнів вагітності. Оцініть клінічну ситуацію:

- A. *Аборт у ходу
- B. Аборт, що не відбувся
- C. Неповний аборт
- D. Загроза аборту
- E. Повний аборт

131. Дитина в терміні гестації 42 тижні. При народженні в амніотичній рідині відмічені частки меконію. Не виключена можливість аспірації новонародженим меконіальних навколоплідних вод. Самостійне дихання відсутнє. Якою повинна бути тактика в даному випадку?

- A. *Санація дихальних шляхів
- B. Тактильна стимуляція
- C. Киснева допомога
- D. Штучний масаж серця
- E. Корекція гіповолемії

132. Медичну сестру навчального закладу викликали з приводу появи у викладача скарги на за грудинний біль стискаючого характеру, що віддає у ліву руку, шию, нижню щелепу, який виник при підйомі по сходах, а також відчуття страху смерті, нестачу повітря. Який з лікарських засобів вона застосує для надання долікарської медичної допомоги?

- A. *Нітрогліцерин
- B. Цитрамон
- C. Еритроміцин
- D. Нітроксолін
- E. Парацетамол

133. Хворого 40-ка років турбує біль у правій здухвинній ділянці, нудота, блювання, то - 37,8°C. Відзначаються позитивні симптоми Ровзінга, Ситковського, Воскресенського. Який найбільш імовірний діагноз?

- A. *Гострий апендицит
- B. Кишкова непрохідність
- C. Гострий панкреатит
- D. Гострий холецистит
- E. Виразка шлунка

134. Пацієнтка 45-ти років скаржиться на спотворення смаку, появу болючих тріщин у куточках рота, ламкість нігтів. Шкіра бліда, Рс- 100/хв., АТ- 95/60 мм рт.ст. У крові - зниження кількості еритроцитів, вмісту гемоглобіну. Про яку патологію слід думати?

- A. *Залізодефіцитна анемія
- B. В12-дефіцитна анемія
- C. Гостра постгеморагічна анемія
- D. Фолієводефіцитна анемія
- E. Гемолітична анемія

135. Дитина 4-х років скаржиться на головний біль, нездужання. При обстеженні медична сестра відзначила підвищення температури тіла до 39,2оС, блідість шкірних покривів, холодні на дотик кінцівки та чоло дитини. Що слід використати для зняття спазму судин?

- A. * Папаверин
- B. Аскорбінова кислота
- C. Фенкарол
- D. Ацелізін
- E. Оксигенотерапія

136. В дитячому садку дитина захворіла гостро. Підвищилась температура тіла до 38оС. Медична сестра, оглядаючи дитину, помітила припухлість в ділянці правої привушної слинної залози, при пальпації залоза тістуватої консистенції, колір шкіри над нею не змінений. З яким захворюванням можна пов'язати ці проблеми?

- A. * Паротитна інфекція
- B. Краснуха
- C. Скарлатина
- D. Дифтерія
- E. Кір

137. При зовнішньому акушерському обстеженні вагітної в терміні 36 тижнів встановлено: над входом в малий таз визначається округла, помірної щільності балотуюча частина плода. Спинка плода зліва. Якому визначенню за акушерською термінологією відповідають отримані дані акушерського дослідження?

- A. * I позиція, головне передлежання
- B. II позиція, головне передлежання
- C. I позиція, сідничне передлежання
- D. II позиція, сідничне передлежання
- E. Поперечне положення

138. Пацієнт 48-ми років скаржиться на постійну задишку, періодично біль в грудній клітці, кашель. Хворіє 15 років. Тривалий час працював шахтарем. Грудна клітка діжкоподібної форми. Над легенями коробковий звук, місцями притуплений. Яке захворювання слід запідозрити?

- A. * Пневмоконіоз
- B. Хронічний бронхіт
- C. Бронхоектатична хвороба
- D. Туберкульоз легень
- E. Рак легень

139. У дитини 5-ти років раптово підвищилася температура тіла до 39,4оС, турбує головний біль дифузного характеру, який посилюється при повороті голови, світлових і звукових подразниках, блювання не пов'язане з прийомом їжі і без нудоти. Дитина сонлива, лежить на боці з відкинутою на зад головою і приведеними до живота

колінами, визначається ригідність потиличних м'язів. Для якого захворювання характерні вказані проблеми?

- A. * Менінгіт
- B. Струс головного мозку
- C. Пухлина головного мозку
- D. Енцефаліт
- E. Крововилив у мозок

140. Дитина 7-ми років захворіла раптово, підвищилася температура тіла до 38,3оС, з'явилися болі у животі, випорожнення часті, кал рідкий з домішками слизу та крові. Об'єктивно: при пальпації живота спостерігається біль у лівій нижній частині. Сигмоподібна кишка пальпується у вигляді щільного, болючого тяжу. Для якої хвороби характерні вказані проблеми?

- A. * Дизентерія
- B. Сальмонельоз
- C. Холера
- D. Стафілококовий ентероколіт
- E. Ротавірусна інфекція

141. Медична сестра ревматологічного відділення, за призначенням лікаря, накладає водний зігрівальний компрес на ліктьовий суглоб. Термін накладання компресу становить:

- A. * 8-10 годин
- B. 1-2 години
- C. 3-4 години
- D. 0,5-1 година
- E. 4-5 годин

142. Хворий 53-х років звернувся до лікаря зі скаргами на схуднення, рідкі випорожнення (7-8 разів на добу), біль внизу живота. Був запідозрений хронічний коліт. Який ендоскопічний метод діагностики призначить лікар?

- A. * Колоноскопія
- B. Фіброгастродуоденоскопія
- C. Цистоскопія
- D. Рентгенографія органів травного каналу
- E. Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини

143. Медична сестра процедурного кабінету здійснює приготування дезінфікуючих розчинів та проводить дезінфекцію інструментів. Яке професійне захворювання може виникнути у медичної сестри, якщо вона не користується гумовими рукавичками?

- A. * Дерматит
- B. Хронічний стрес
- C. Бронхіт
- D. Цироз печінки
- E. Пієлонефрит

144. У непритомного пацієнта починається блювання. Медична сестра повернула голову пацієнта на бік, під кутик рота поставила ниркоподібний лоток. Для запобігання якого ускладнення виконала такі дії медсестра?

- A. *Аспірація блювотних мас
- B. Шлунково-кишкова кровотеча
- C. Стоматит
- D. Гінгівіт
- E. Попередження забруднення постільної білизни блювотними масами

145. У хворого 30-ти років раптово виник гострий біль у поперековій ділянці з правого боку, який іррадіює у внутрішню поверхню стегна, біль при сечовипусканні. Для якого стану характерні дані ознаки?

- A. *Ниркова колька
- B. Печінкова колька
- C. Гострий апендицит
- D. Гострий холецистит
- E. Гострий аднексит

146. У тракториста після обприскування сільськогосподарських угідь фосфорорганічними пестицидами з'явилися слинотеча, блювання. Об'єктивно: міоз, блідість шкіри, АТ- 80/50 мм рт.ст. Який препарат слід застосувати при наданні медичної допомоги?

- A. *Атропін
- B. Адреналін
- C. Кофеїн
- D. Унітіол
- E. Хлористий кальцій

147. Роділля в I періоді пологів. Пологи тривають 4 години, останню годину перейми посилились, стали болючими, з'явилась позитивна ознака Вастена. Серцебиття плода становить 125/хв. Яке ускладнення пологів розвинулось у роділлі?

- A. *Клінічно вузький таз
- B. Дискоординація пологової діяльності
- C. Слабкість пологової діяльності
- D. Надмірна пологова діяльність
- E. Дистрес плода

148. Пацієнтка доставлена в приймальне відділення зі скаргами на слинотечу, нудоту, блювання, біль у животі, слезоточивість, порушення зору. Ці явища виникли після знищування мух і комарів. Якеотруєння запідозрить медична сестра у пацієнта?

- A. *Фосфорорганічними сполуками
- B. Метилловим спиртом
- C. Чадним газом
- D. Хлорорганічними сполуками

Е. Ртутьорганічними сполуками

149. Хлопчик 12-ти років знаходиться на стаціонарному лікуванні з приводу гострого гломерулонефриту. З анамнезу відомо, що 2 тижні тому він переніс скарлатину. Яка з проблем дитини буде свідчити про перенесену інфекцію?

- А. *Пластинчаті лущення на долонях і підшвах
- В. Рясні висипання яскраво-червоного кольору
- С. Блідий носо-губний трикутник
- Д. Дрібноточкові крововиливи на згинах
- Е. Болі у глотці під час ковтання

150. У пацієнта 60-ти років, що хворіє на гіпертонічну хворобу, виник напад ядухи, кашель з виділенням пінистого харкотиння рожевого кольору. Яке ускладнення розвинулось у пацієнта?

- А. *Набряк легень
- В. Інфаркт міокарда
- С. Легенева кровотеча
- Д. Тромбоемболія легеневої артерії
- Е. Напад бронхіальної астми